

Journée mondiale de l'asthme : information et dépistage

Mardi 02 mai 2017 | 10h-16h
Hôpitaux de Brabois, Vandoeuvre-lès-Nancy
Hall d'accueil du Bâtiment Philippe Canton

Les professionnels du **Département de Pneumologie du CHRU de Nancy**, sous la coordination du Dr Angelica Tiotiu, pneumologue et allergologue, se mobilisent à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme et organisent un stand d'information et de dépistage accessible à tous.



Avec leurs partenaires, le service d'Explorations Fonctionnelles Respiratoires et l'équipe de tabacologie du Département de Pneumologie du CHRU de Nancy, ils proposeront aux visiteurs :

- des **mesures du débit de pointe** (test de dépistage et de suivi de l'asthme)
- des **spirométries** (tests de mesure spécifiques de la fonction respiratoire indispensables pour le diagnostic et le suivi)
- des **démonstrations sur la technique d'utilisation des traitements inhalés**
- des **informations sur la maladie asthmatique** (symptômes, diagnostic, traitement, facteurs déclenchants de la crise, facteurs aggravants et leur prise en charge, gestion de la crise en urgence...)
- **aide au sevrage tabagique**, le tabagisme étant un facteur d'environnement déclenchant et aggravant de l'asthme, comme un facteur de risque de développement des allergies

*Plus de 4 millions de Français sont concernés par l'asthme, soit une prévalence de 7,1 % (5,2 % en Lorraine). La prévalence des allergies en France est estimée à 13,8% et entre 70-80% des asthmatiques adultes sont allergiques.

6 asthmatiques sur 10 sont insuffisamment contrôlées en raison de la présence de facteurs aggravants (allergies, tabagisme, obésité, reflux gastro-œsophagien, pollution de l'environnement, comorbidités ORL ou facteurs psychologiques) ou d'une adhérence au traitement déficitaire.

La mortalité et le nombre d'hospitalisations pour asthme baissent depuis 2000 grâce à l'existence de recommandations internationales et par une meilleure éducation thérapeutique des patients, mais des progrès restent à faire pour proposer une meilleure prise en charge de cette maladie chronique très répandue.

La prise en charge globale du malade doit prendre en compte, en dehors du traitement spécifique, les comorbidités, les facteurs de risque individuels, les éléments de l'environnement socio-économique et familial du patient, afin d'obtenir un contrôle satisfaisant de la maladie et améliorer la qualité de vie de ces patients.

* Source : *Enquête santé et protection sociale (ESPS) – 2006, 2012*